

Hesten smittes med strongylider i græsningsæsonen og smittepresset er højest i sensommeren



Foto: Stalla Sigsgaard

Den lille ormeguide

Hestene er udsat for tre forskellige typer orm. Her kan du se hvornår det er bedst at undersøge for orm, hvordan ormene bedst diagnosticeres og hvilke ormemedler der virker

■ Af dyrlæge Martin Krarup Nielsen

Strongylider

FOREKOMST:

Strongylider forekommer hos alle heste.

ÅRSTID:

Strongyliderne er til stede året rundt, men smitten sker i løbet af græsningsæsonen og er temperaturafhængig. Græsmarkssmitten er oftest kraftigst i sensommeren.

DIAGNOSTIK:

Gødningsprøver kan bruges til at påvise hvor meget den enkelte hest bidrager til græsmarkssmitten med strongylider samt til at undersøge effekten af ormekuren. En larvedyrkning kan påvise blodorm.

BEHANDLING:

Der findes tre typer ormemedler til behandling af strongylider: fenbendazol, pyrantel og ivermectin/moxidectin. I Danmark er der udbredt resistens mod fenbendazol, ligesom pyrantelresistens kan forekomme.

CODE TIDSPUNKTER:

Hos voksne heste er det fornuftigt at tage gødningsprøve i foråret og igen i efteråret. Heste med høje ægtal kan genbehandles midt på sommeren. Det anbefales at alle heste får en ormekur mod strongylider og bændelorm om efteråret.

Bændelorm

FOREKOMST:

Bændelorm forekommer hos 20-80% af alle heste, men findes normalt i alle besætninger.

ÅRSTID:

Som med strongyliderne er foregår smitte med i løbet af græsningsæsonen. Bændelormebyrder ophobes gennem græsningsæsonen og vil oftest være kraftigst i efteråret.

DIAGNOSTIK:

En særlig gødningsanalyse kan bruges til at påvise bændelormeæg og er fundet pålidelig til påvisning af ormebyrder på over 20 orm. Blod- og spyttanalyse for antistoffer mod bændelorm kan bruges på besætningsplan til at undersøge hvor kraftigt smittepresset er.

BEHANDLING:

Der findes to typer ormemedler til behandling af bændelorm: pyrantel (dobbelt dosis) og praziquantel. Begge er virksomme.

CODE TIDSPUNKTER:

Den særlige gødningsanalyse er bedst at gennemføre om foråret, mens blod- og spyttanalyserne er bedst at foretage om efteråret. En efterårsbehandling for bændelorm anbefales medmindre blod- eller spyttanalyser har vist at besætningen har et meget lavt smittepres med bændelorm. Denne undersøgelse skal foretages på et bredt udsnit af heste i besætningen.

Bændelorm forekommer i 20-80% af alle heste og kan diagnosticeres med en særlig gødningsanalyse når hesten er inficeret med mere end 20 orm



Foto: martin krarup nielsen

Spolorm:

FOREKOMST:

Spolorm forekommer hos alle føl og kan desuden findes sporadisk hos plage og voksne heste.

ÅRSTID:

Spolormene følger ikke årstidernes skiften, da smitte kan forekomme ude såvel som inde. Hos føllene er smitten hovedsageligt styret af føllenes alder og immunitet.

DIAGNOSTIK:

Gødningsprøver kan bruges til at påvise spolormeinfektion fra omkring tremånedersalderen. Desuden kan ultralydsscanning bruges til påvisning af større ormebyrder.

BEHANDLING:

Der findes tre typer ormemedler til behandling af spolorm: fenbendazol, pyrantel og ivermectin/moxidectin. I Danmark er der påvist resistens mod ivermectin/moxidectin.

GODE TIDSPUNKTER:

Føl bør behandles første gang, når de er cirka 2 måneder gamle og anden gang ved 5-månedersalderen, før de fravænnnes. En gødningsprøve kan være brugbar på dette tidspunkt. De bør desuden undersøges igen tidligt i deres årringsår, for at fastslå om der stadig er spolorm til stede.

AVANT
Danmark

Stort redskabsprogram
Stort brugtmarked

Ridebaneplaner fra
19.500 kr
Ridebaneplaner er vist med ekstra udstyr.
Vi tilbyder gode og attraktive
leasing muligheder - og
tager gerne brugt i bytte.

Ring for demo

Overfaldsgreb	Front kultivator
Under hegn klipper	Wraptang
Hestpæropsamler	Græsklipper med opsamler
Pallegafler	Hestpæresuger

7 serier - over 100 redskaber

www.avant.dk

AVANT
Danmark

Jylland - 8695 7522

Sjælland - 5965 6037